

سیستم سطح بندی بر اساس شدت بیماری در بخش نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان (NICU)

<p>*مراقبت های اولیه شامل مراقبت از نوزاد سالم *ارزیابی و مراقبت پس از زایمان نوزاد سالم</p>	<p>سطح یک (نوزادان)</p>
<p>نوزادان بدون وابستگی (NO Dependenth): *نوزادان دارای بیلی روبین بالا(بدون تعویض خون),تحت درمان فتوتراپی بستری شده. *نوزادان دارای رگ محیطی جهت سرم تراپی به لحاظ درمان دهیدراتاسیون</p>	<p>سطح دو (نوزادان)</p>
<p>نوزادان با وابستگی کمتر (Low Dependenth): *ارایه مراقبت به نوزادان در 34 تا 36 هفته. *نوزادانی که جهت وزن گیری در بخش بستری می شوند, از جمله: نوزادان پره ترم بدون مشکل حاد تنفسی,سپسیس, پنومونی و... که فقط سرم و دارو می گیرند. *نوزادان دارای بیلی روبین بالا که نیازمند تعویض خون و سایر اقدامات درمانی شامل آنتی بیوتیک تراپی و سرم تراپی و...هستند.</p>	<p>سطح سه (NICU)</p>
<p>نوزادان با وابستگی شدید (High Dependenth): *احیا و تثبیت نوزادان زودرس . *ارائه مراقبت از نوزادان با سن حاملگی کمتر از 33 هفته ووزن کمتر از 1500 گرم که به دلیل عدم بلوغ فیزیولوژیک دارای مشکلاتی مانند آپنه نارسه, عدم توانایی برای حفظ دمای بدن,ناتوانی در تغذیه دهانی و...می باشند. *ارائه مراقبت از نوزادان تحت تهویه مکانیکی و یا مراقبت از نوزادان تحت CPAP(فشار مثبت مداوم راه هوایی) را داشته باشند. *ارائه مراقبت به نوزادان دارای شرایط حاد تنفسی (RDS), (MAS).</p>	<p>سطح چهار (NICU)</p>
<p>نوزادان با وابستگی خیلی شدید (Very high Dependenth): *توانایی برای ارائه مراقبت جامع برای نوزادان متولد شده با حاملگی 28 هفته و وزن >1000 گرم . *توانایی برای ارائه مراقبت از نوزادان نیازمند به تهویه مکانیکی . *انجام اعمال جراحی جزئی و پیشرفته مانند قراردادن کاتتر ورید نافی و مرکزی و یا تعبیه چست تیوب و فیستول تراشه و آترزی مری و انتروکولیت نکروزان و سوراخ شدن روده و....</p>	<p>سطح پنج (NICU)</p>