

راهنمای استفاده از ترالی احیای نوزاد

پائیز ۱۴۰۲

ترالی احیای نوزاد در اتاق زایمان و اتاق عمل سزارین

ملزومات مورد نیاز و ترالی احیای نوزاد در بخش زایمان، اتاق عمل سزارین و اورژانس زایمان مطابق دستورعمل ابلاغی پیوست ۲ می باشد.

لازم به ذکر است ترالی احیای بزرگسال در این بخش ها طی نامه شماره ۴۰۰/۳۹۵۵ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ابلاغ شده است.

ترالی احیای نوزاد در بخش های بستری نوزادان

در همه بخش های بستری نوزاد با عناوین مختلف شامل NICU, POSTNICU و بخش نوزادان، از ترالی احیای نوزاد با ملزومات ویژه بخش های بستری نوزاد استفاده شود.

لازم به ذکر است در مراکزی که بخش نوزادان ندارند و صرفاً چند تخت در بخش کودکان / ... به منظور بستری نوزادان دارند نیز باید ترالی احیای نوزاد با ملزومات ویژه بخش های بستری نوزاد داشته باشند.

ملزومات و تجهیزاتی که در شناسنامه ترالی مزبور با علامت * مشخص شده اند و مختص بخش NICU هستند شامل:

- تشک گرمایی برای نوزادان بسیار نارس
- نمایشگر الکترونیکی قلب نوزاد (ECG)
- لیدهای ECG کودکان
- استایلر
- کیسه پلاستیکی ویژه نوزادان بسیار نارس (سن بارداری کمتر از ۳۲ هفته)

ملزومات و تجهیزاتی که در شناسنامه ترالی با علامت ** مشخص شده اند و مختص بخش نوزادان و اتاق نگهداری نوزادان بستری هستند شامل:

- دستگاه ساکشن پرتابل
- بلندر
- تجهیزات مصرفی مانند آنژیوکت آبی شماره ۲۲
- سه راهی آنژیوکت
- هیپارین لاک

به منظور آمادگی و فراهم سازی به موقع تجهیزات و ملزومات ضروری برای احیای بزرگسالان و ایمنی کارکنان و مادران حاضر در بخش های بستری نوزادان، بسته احیای بزرگسال در قالب کیف احیای بزرگسال شامل محتویات زیر باید در طبقه پنجم ترالی قرار بگیرد.

محتویات کیف احیای بزرگسال:

منطبق با دستورعمل کشوری استانداردهای دارویی بخش اورژانس بیمارستانی (ویرایش هشتم)
نامه شماره ۴۰۰/۳۹۵۵ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵:

داروها:

- آمپول اپی نفرین * 1mg/ml (1:1000) به تعداد ۵ عدد
- آتروپین*: 0.5 mg/ml, 1mL به تعداد ۵ عدد
- آمیودارون*: 50 mg/ml, 3ml به تعداد ۳ عدد
- لیدوکائین ۲٪*: 20 mg/ml, 5mL به تعداد ۳ عدد
- آدنوزین*: 3 mg/ml, 2mL به تعداد ۳ عدد
- دوپامین*: 40 mg/ml, 5mL به تعداد ۲ عدد
- نالوکسان: 0.4 mg/ml, 1mL به تعداد ۵ عدد
- دیازپام: 5 mg/ml, 2mL به تعداد ۵ عدد
- کلسیم گلوکونات *10%: 100 mg/ml, 10mL به تعداد ۳ عدد
- نور اپی نفرین*: 1 mg/ml, 4mL به تعداد ۳ عدد
- سولفات منیزیم * 50٪: 50mL به تعداد ۲ ویال
- دکستروز 50%: 50mL به تعداد ۲ عدد

تجهیزات:

- بگ بزرگسال: بگ تهویه مصنوعی بزرگسال از جنس سیلیکون، دارای کیسه یا لوله ذخیره اکسیژن به همراه ماسک شفاف یک بار مصرف صورت یک عدد
- ماسک: ماسک اکسیژن صورت (Face Mask) به همراه لوله رابط در سایز بزرگسال یک عدد
- لارنگوسکوپ: لارنگوسکوپ بزرگسالان با تیغه های ۳ و ۴ از هر کدام یک عدد به همراه دو عدد باتری یدک و یک عدد لامپ یدک لارنگوسکوپ
- لوله تراشه : لوله تراشه کاف دار در اندازه های ۶/۵، ۷، ۷/۵، ۸، ۸/۵ از هر کدام حداقل ۲ عدد

- Airway: راه هوایی دهانی (Oral Airway) یک بار مصرف در اندازه های مختلف بزرگسال از هر کدام یک عدد

- کاتتر نلاتون: قرمز، نارنجی، سبز از هر کدام دو عدد

- ماسک حنجره ای بزرگسال (LMA) دو عدد

تذکر مهم: داروهایی که در کیف احیای بزرگسال با (*) مشخص شده اند نیاز به استفاده از مانیتورینگ قلبی هنگام تجویز دارند.

دارو و تجهیزات احیای نوزاد در ترالی بخش اورژانس

- آمپول اپی نفرین 0.1mg/10mL (1:10000) تزریقی به تعداد ده عدد در کشوی اول اضافه گردد.

- آمپول اپی نفرین 1mg/1mL (1:1000) تزریقی به تعداد ده عدد در کشوی دوم ردیف ۲۶ به لیست دارویی ترالی احیا اضافه شود

- ست تزریق داخل استخوان (اینترا اوسئوس) طبقه سوم اضافه شود (اختیاری)

- استیلت به کشوی طبقه چهارم اضافه شود.

- LMA شماره یک دو عدد، پروپ نوزادان برای مانیتورینگ قلبی، لوله تراشه بدون کاف شماره ۴ به تعداد دو عدد در کشوی طبقه ۵ اضافه شود.

- وجود تی پیس احیا و تشک گرمایی برای نوزادان بسیار نارس، اختیاری است.

ترالی احیای نوزاد بخش های پس از زایمان (post partum) یا بخش هم اتاقی مادر و نوزاد (Rooming In)

در بخش های پس از زایمان و هم اتاقی مادر و نوزاد که مادر بستری بوده و نوزاد سالم همراه مادر در بخش مراقبت می شوند ترالی احیا همان ترالی ابلاغی احیای بزرگسال بخش اورژانس مطابق با دستور عمل مدیریت بیمارستانی است.